



14 al 17 octubre
2026

VIGO

Situando a las vacunas en su lugar,
una prioridad sanitaria y social

DISTRIBUCIÓN DE LA VACUNACIÓN FRENTE A GRIPE EN UN SERVICIO DE MEDICINA PREVENTIVA Y VACUNACIÓN INTERNACIONAL EN HOSPITAL DE TERCER NIVEL

Manrique Vinagre N. (S. Medicina Preventiva HCUV), de Álvaro García C. (S. Medicina Preventiva HCUV), Gómez Esteban A. (S. Medicina Preventiva HCUV) Seco de Miguel A. (C.S. Tórtola GAPVAE), Martínez Alonso M. (S. Medicina Preventiva HCUV), Castrodeza Sanz J.J. (S. Medicina Preventiva HCUV)

Objetivos


Analizar la distribución de la vacunación frente a la gripe de la temporada 2025/2026 en el Servicio de Medicina Preventiva y Vacunación Internacional en un hospital de tercer nivel.

Método

Se elabora una base de datos donde se anotan las variables: número de historia clínica, nombre y apellidos de la persona vacunada, motivo de vacunación obedeciendo a enfermedad renal crónica, estudiante, familiar de paciente, inmunodeficiencia primaria, neoplasia, patología hematológica, patología pulmonar, otros, Prep, TASPE, trabajador, trasplante, tratamiento inmunosupresor, viajero internacional e infección por VIH; fecha de vacunación, tipo de vacuna y médico solicitante. Posterior anonimización y análisis de datos. Desde la fecha 09/10/2025 hasta 16/02/2026.

Resultados

Se registraron un total de 467 vacunados, de los cuales 145 recibieron Fluad tetra, 320 Vaxigrip y 1 Flucelvax. En cuanto a la distribución por motivo de vacunación, como sigue en el gráfico 2.



Conclusiones

La vacunación frente a la gripe en viajeros junto a trabajadores y estudiantes suponen un total de 209 dosis, lo cual resulta en un 44,7% del total de vacunados.

- El 55,3% restante corresponde a patología de riesgo y familiares.
- De los 258 pacientes de riesgo vacunados y familiares, el grupo mayoritario corresponde a tratamiento inmunosupresor, con un 60%. Frente a este grupo el minoritario estaría compuesto por TASPE con tan solo 1 paciente de riesgo.

La vacunación frente a la gripe especialmente en los grupos de riesgo supone una potente herramienta para disminuir las complicaciones asociadas por lo que fomentar esta vacuna entre estos grupos es fundamental.