



14 al 17 octubre 2026

VIGO

Situando a las vacunas en su lugar,
una prioridad sanitaria y social

VACUNACIÓN FRENTE A RUBEOLA Y VARICELA DURANTE EL INGRESO EN MATERNIDAD A MUJERES PUÉRPERAS CON SEROLOGÍA NEGATIVA REALIZADA DURANTE EL EMBARAZO

Iván García Fraile (1); Ignacio Díaz Vázquez (1); María José Pardo Landrove (1); María Virginia Lorenzo García (1); Alba Pérez Dalí (2).

1. Servicio de Medicina Preventiva, Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol.
2. Servicio de Admisión y Documentación Clínica, Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol.

Objetivos

Incrementar la cobertura de vacunación frente a rubeola y/o varicela en mujeres puérperas que presentan una serología negativa realizada durante el embarazo.

Descripción



Periodo estudio: 17 meses (enero 2025 – mayo 2026)


230 pacientes:

- Mediana edad 30,8 años.
- 70% nacionalidad española.



Estudio serológico	
IgG Rubeola	IgG Varicela
Positivo: 64 (27,8%)	Positivo: 147 (63,9%)
Límite: 57 (24,8%)	Negativo: 83 (36,1%)
Negativo: 109 (47,4%)	
Total: 230 pacientes	

Flujograma de resultados:



Conclusiones

La estancia en la maternidad tras el parto constituye una gran oportunidad de estrategia proactiva para aumentar las coberturas de vacunación en mujeres puérperas seronegativas que precisan vacunación frente a rubeola y/o varicela.

Derivar la inmunización tras el alta hospitalaria puede conllevar un elevado porcentaje de incumplimiento de las recomendaciones prescritas.

Interés

Esta experiencia demuestra que la inmunización de mujeres puérperas durante el ingreso en maternidad constituye una estrategia proactiva que puede aumentar la adherencia y conseguir mejores coberturas de vacunación que modelos tradicionales.

Reproductibilidad

Este sistema es fácilmente reproducible para todos aquellos centros que dispongan de Servicio de Medicina Preventiva que pueda revisar estos casos para dar recomendaciones de vacunación a estas pacientes.