



14 al 17 octubre 2026

VIGO

Situando a las vacunas en su lugar,
una prioridad sanitaria y social

C0147 PROFILAXIS POSTEXPOSICIÓN FRENTE A LA RABIA EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL: EXPERIENCIA DE 5 AÑOS Y ALGORITMO O PROTOCOLO DE ACTUACIÓN

Beltrán-Gómez E⁽¹⁾, Figueroa-Farfán C.N⁽¹⁾, Calero-Lezama C⁽²⁾, Cangas-Riola C⁽¹⁾, Escribano-Jañez A⁽¹⁾, Viña Simón MC⁽¹⁾
(1)Servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública (2)Servicio de Prevención Riesgos Laborales
Hospital Universitario Río Hortega - Valladolid

CONTENIDO

INVESTIGACIÓN

Objetivos:

Describir la profilaxis postexposición vacunación frente a la rabia realizada en un hospital de tercer nivel en los últimos 5 años (2021-2026) y proponer una estrategia ágil que facilite la correcta pauta vacunal en los servicios de urgencias pediátricas y de adultos, según el riesgo de exposición.

Método:


Estudio descriptivo retrospectivo mediante revisión de las vacunas antirrábicas administradas entre junio de 2021 y junio de 2026 a través del sistema de registro informático hospitalario.

Resultados:


En total se administraron 57 dosis de vacuna frente a la rabia en 28 pacientes. De estos, el 61% (n=17) fueron varones y el 39% mujeres (n=11). La mediana de la edad fue de 30 (RIC: 21-50). En cuanto al número de dosis recibidas, el 46% (n=13) recibió una sola dosis, el 25% (n=7) dos dosis, el 7% (n=2) tres dosis y el 21% (n=6) completó cuatro dosis.

La distribución anual de dosis administradas fue de 4 (2021), 0 (2022), 14 (2023), 12 (2024), 20 (2025) y 7 (2026), con 3, 0, 6, 7, 9 y 3 pacientes, respectivamente. Se observó una mayor frecuencia de administración en los meses de junio a agosto.

Distribución casos durante el año




Sexo



■ Varones ■ Mujeres

Dosis por paciente



Discusión:

En nuestro centro se observa un incremento progresivo de las consultas por exposición con riesgo de rabia durante el periodo estudiado, en especial en meses de verano. La variabilidad en el número de dosis administradas pone de manifiesto la necesidad de herramientas que faciliten la correcta indicación y seguimiento de la profilaxis posexposición.

Conclusiones / Recomendaciones:

Se diseña un algoritmo visual con el objetivo de homogeneizar la práctica clínica y mejorar la adherencia a las recomendaciones vigentes en la atención urgente, realizando recordatorios anuales en los meses pre-verano.