

C0149 VACUNACIÓN FRENTE A MPOX: PERFIL DE RIESGO Y EVOLUCIÓN CLÍNICA REAL

Beltrán-Gómez E(1), Figueroa-Farfán C.N(1), Villa-Pizarro R(1), Minguez-González S(1), Fernandez-García A.A(1), Viña Simón MC(1)
(1)Servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública - Hospital Universitario Río Hortega - Valladolid

CONTENIDO

Introducción:

La infección por el virus mpox emergió como un problema de salud pública relevante en Europa desde el año 2022, especialmente en hombres que tienen sexo con hombres con prácticas sexuales de riesgo. España implementó estrategias de vacunación priorizando a personas con alto riesgo de exposición, así como la profilaxis postexposición en contactos estrechos.

Objetivo: Describir el perfil de pacientes vacunados frente a mpox en los últimos 4 años (2022 a 2025).





Método: Estudio retrospectivo observacional realizado en pacientes vacunados frente a mpox en un hospital universitario de tercer nivel en el periodo 2022-2025.

Resultados:

Se vacunaron 135 pacientes, el 96% varones; mediana de edad=38 años (RIC: 12,5). Se administraron 253 dosis; 18 pacientes (13%) recibieron una dosis única, 116 (86%) dos dosis y 1 paciente (1%) tres dosis. Las vacunas utilizadas fueron Imvanex® (22%) y Jynneos® (78%).

Las indicaciones fueron: profilaxis pre-exposición por prácticas sexuales de riesgo (90,1%), profilaxis pre-exposición en personal sanitario (5,5%), postexposición en inmunosupresión (2%), pre-contactos estrecho sin alto riesgo (1,6%) y profilaxis pre-exposición personal sanitario (0,8%).

Año	Dosis: n (%)
2022	6 (2,4%)
2023	73 (28,9%)
2024	67 (26,5%)
2025	107 (42,3%)



Discusión:

La vacunación frente a mpox se ha centrado principalmente en población masculina con prácticas de riesgo. El aumento progresivo de dosis refleja la mejora en la disponibilidad vacunal y en las estrategias preventivas.

Conclusiones / Recomendaciones:

La vacunación frente a mpox se dirige fundamentalmente a grupos de alto riesgo, con un incremento en los últimos años. Es importante mantener las estrategias de prevención dirigidas y garantizar el acceso a la vacunación en poblaciones vulnerables.