



**14 al 17 octubre
2026**

VIGO

Situando a las vacunas en su lugar,
una prioridad sanitaria y social

Impacto de la vacunación antineumocócica conjugada 20-valente en pacientes inmunosuprimidos.

Análisis de los casos de Enfermedad por *Streptococcus pneumoniae* tras la vacunación

Ruth Figueroa Cerón¹, Carlos Azpiazu Maseda¹, Jorge Taboada Gomez¹, Udane Tarbernilla Uriarte¹, Veronica Custarday Nieva¹, Aide Arias Ferreiros¹, Paula Fernandez Gonzalez¹.

¹ Servicio de Medicina Preventiva Y Salud Pública, OSI Bilbao Basurto, Bilbao, España.

CONTENIDO

Objetivos: Los pacientes inmunocomprometidos presentan un riesgo elevado de enfermedad neumocócica invasiva (ENI), con importantes repercusiones clínicas y asistenciales. La vacunación antineumocócica constituye una estrategia preventiva prioritaria en esta población. El objetivo del estudio fue describir la incidencia de ENI y las características clínicas de los pacientes inmunosuprimidos vacunados que desarrollaron infección neumocócica en un hospital terciario.

Descripción: Estudio observacional, descriptivo y retrospectivo realizado en la consulta de Medicina Preventiva y Salud Pública del Hospital Universitario de Basurto. Se incluyeron todos los pacientes inmunosuprimidos vacunados frente al neumococo entre enero y diciembre de 2025. Se analizaron los episodios de ENI, las comorbilidades asociadas, la necesidad de hospitalización, el ingreso en UCI y la mortalidad.



Conclusiones: La incidencia de infección neumocócica en pacientes inmunosuprimidos vacunados fue baja y la evolución clínica favorable, con ausencia de ingresos en UCI y mortalidad limitada a un paciente con enfermedad terminal. Estos hallazgos apoyan el beneficio de las estrategias de vacunación antineumocócica en poblaciones de alto riesgo.

Recomendaciones: Mejorar la tasa vacunal en el grupo 7 inmunosupresión. Valorar refuerzos