



14 al 17 octubre 2026

VIGO

Situando a las vacunas en su lugar,
una prioridad sanitaria y social

REACCIONES ADVERSAS POSVACUNALES: CARACTERIZACIÓN Y EXPERIENCIA EN UNA UNIDAD DE VACUNACIÓN



Manuz García MC¹; Quintilla Martínez, L^{1,2}; Cortés Salán, L¹; Rodríguez Cundín MP^{1,3}, Arozamena Pérez, J¹; Rebollo Rodrigo MH¹

1: Servicio de Medicina Preventiva y Seguridad del Paciente del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla
2: Componente del Grupo de Trabajo de Vacunología Social de la Asociación Española de Vacunología
3: Componente del Grupo de Trabajo de Información a pacientes de la Asociación Española de Vacunología



OBJETIVO

Describir las reacciones adversas posvacunales registradas en una Unidad de Vacunación.

DESCRIPCIÓN

Estudio descriptivo retrospectivo



Revisión de reacciones adversas registradas en programa específico de la Unidad de Vacunación



1 de junio de 2025 -31 de marzo de 2026

→ **712** notificaciones de **reacciones adversas**

→ Correspondientes a **455** pacientes



(60,2% mujeres)
Edad media: 49,14 años (DE: 14,15)

468 reacciones locales leves

14 locales intensas
466 sistémicas leves.

No se registraron reacciones sistémicas graves.

En 239 ocasiones se notificaron simultáneamente una reacción local leve y una sistémica leve tras la administración de la misma vacuna .

En 5, coexistieron una reacción local intensa y una sistémica leve.

The screenshot shows a web-based form titled 'Vacunación'. It includes fields for 'Fecha vacunación', 'Dosis', 'Vacuna', 'Lote', 'Marca comercial', 'Consulta', 'Vía y Localización', 'Fecha caducidad', and 'Profesional que administra la vacuna'. There are checkboxes for 'INASISTENCIA', 'NO SE VACUNA', and 'Se entrega informe y cartilla vacunal'. A section for 'Alguna reacción adversa' has radio buttons for 'No' and 'Si'. Under 'Reacción adversa', there are checkboxes for 'Reacción local leve', 'Reacción local intensa', 'Reacción sistémica leve', and 'Reacción sistémica grave'. Below this, there are four columns of checkboxes for specific reactions: 'Reacción local leve' (Calor, Dolor, Enrojecimiento, Picor, Inflamación), 'Reacción local intensa' (Inflamación extendida, Fenómeno de Arthus, Nódulo), 'Reacción sistémica leve' (Febrícula, Fiebre termométrada, Mialgias, Astenia, C. pseudogripal, C. vasovagal), and 'Reacción sistémica grave' (Anafilaxia, Convulsiones, Trombopenia, Otras). The form has 'Guardar y Salir' and 'Salir' buttons at the top right.

Mayor número de reacciones:

-Herpes Zóster (285)

-Anti-Neumocócica 20 valente (143)

-COVID-19 (57)

No se observó asociación entre la aparición de reacciones adversas y la pauta activa de un tratamiento inmunosupresor, así como con el servicio de procedencia del paciente.



CONCLUSIONES

Las reacciones adversas registradas fueron **mayoritariamente leves**.

Las vacunas frente al **hérpes zóster y neumococo** concentraron el mayor número de notificaciones.

INTERÉS

Conocer el perfil de las reacciones adversas permite optimizar el consejo prevacunal, informar adecuadamente a los pacientes sobre los efectos esperables y favorecer un manejo precoz y adecuado de los síntomas tras la vacunación.

REPRODUCIBILIDAD/RECOMENDACIONES

La revisión sistemática de las reacciones adversas es una estrategia fácilmente reproducible en cualquier Unidad de Vacunación y puede contribuir a mejorar la información proporcionada a los pacientes y la monitorización de la seguridad vacunal.