



PRIMEROS OCHO MESES DE VACUNACIÓN FRENTE AL VIRUS RESPIRATORIO SINCITAL: PERFIL DEL PACIENTE Y ESTRATEGIA HOSPITALARIA

OBJETIVOS



Describir la estrategia de vacunación y las características de los pacientes que recibieron la vacuna frente al virus respiratorio sincital (VRS) en los primeros ocho meses de campaña en una unidad de vacunación hospitalaria.

MÉTODO



Estudio retrospectivo



Seguimiento de pacientes vacunados frente al VRS en la Unidad de Vacunación del Servicio



7 de octubre de 2025 -30 de mayo de 2026

Según la instrucción de la Dirección General de Salud Pública se incluyeron inicialmente solo a los pacientes trasplantados de pulmón, para posteriormente (febrero 2026) incluir el resto de trasplantes de órgano sólido, así como trasplantados de progenitores hematopoyéticos/CAR-T.

Los pacientes se **captaron** tanto de **manera proactiva (79,55%)** como mediante la **derivación** de estos pacientes desde sus servicios de referencia **(20,45%)**.

A todos los pacientes se les ofreció **información tanto oral como escrita** tanto en la consulta médica como en la de enfermería acerca de esta vacuna. Se recogieron variables demográficas, clínicas y del proceso vacunal.


RESULTADOS



Se incluyeron **313 pacientes**

60,21% hombres


Edad media: **60,19 años** (DE 10,78)



Tras la información recibida el **100% de los pacientes aceptó la vacuna**.

Se realizaron coadministraciones con la vacuna antineumocócica conjugada 20 valente (66), antigripal (13), COVID-19 (5) y Herpes Zóster (2).

Únicamente se notificaron 3 reacciones adversas, todas locales leves



DISCUSIÓN



La elevada aceptación a una vacuna nueva respalda la implantación de estrategias basadas en una información adecuada al paciente inmunodeprimido. Se observa un buen perfil de seguridad de la vacuna.

CONCLUSIONES/RECOMENDACIONES



La estrategia permitió alcanzar en los primeros meses **tasas elevadas de vacunación** en la población diana, con una excelente aceptación. Se recomienda mantener estrategias de captación activa y reforzar los sistemas de seguimiento de los pacientes.