



**14 al 17 octubre  
2026**

**VIGO**

Situando a las vacunas en su lugar,  
una prioridad sanitaria y social

## COBERTURAS DE VACUNACIÓN EN PERSONAS ADULTAS CON CONDICIONES DE RIESGO FRENTE A ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES

**Consuelo Bautista Fernández, María Alejandra López-Zambrano, Soledad Cañellas Llabrés, María Vázquez Torres, Marta Molina Olivas, Amaya Sánchez-Gómez**

*Subdirección General de Prevención y Promoción de la Salud, Consejería de Sanidad. Comunidad de Madrid, España*

### OBJETIVOS

Estimar la cobertura de vacunación en personas adultas con condiciones de riesgo frente a las principales enfermedades inmunoprevenibles.

### MÉTODO

Estudio descriptivo transversal de la base poblacional de una Comunidad Autónoma española. Se extrajo la población de los registros poblacionales y se identificó aquella de riesgo mediante antecedentes de atención primaria y especializada. El estado vacunal se obtuvo del registro de vacunación, considerando las dosis registradas hasta el 31 de marzo de 2026 y aplicando criterios específicos de cómputo para cada vacuna. Las coberturas se calcularon como la proporción de personas con al menos una dosis sobre el total de personas con indicación vacunal para dicha vacuna, estratificándose por edad y condición de riesgo.

### RESULTADOS

**28,4 %**

de la población adulta con al menos una condición de riesgo (1.697.828 personas)

**52,9 %**


en personas de 60 o más años

**18,3 %**

en personas de 18 a 59 años

#### Cobertura de vacunación (%) en personas con condiciones de riesgo, según edad

■ 60 o más años ■ 18 a 59 años



\* Hepatitis A: dato solo disponible en personas de 18 a 59 años.

Las coberturas fueron más elevadas en grupos de alto riesgo, especialmente trasplante de progenitores hematopoyéticos, trasplante de órgano sólido, asplenia y hemodiálisis.

### DISCUSIÓN

Las coberturas en los grupos de alto riesgo son superiores frente al resto de patologías. La cobertura se incrementa a mayor edad, particularmente en vacunas con indicación poblacional.

### CONCLUSIONES

Existe margen de mejora en la vacunación en grupos de riesgo, especialmente en personas de 18 a 59 años, así como en enfermedades crónicas frecuentes.