



14 al 17 octubre 2026

VIGO

Situando a las vacunas en su lugar, una prioridad sanitaria y social

C0282 -Conocimiento sobre la vacunación en el paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica: Estudio VAC-EPOC



Felipe Villar Álvarez¹, Àlvar Agustí García-Navarro², Francisco Sanz Herrero³, Patricia Sobradillo Ecenarro⁴, Elisa Salamanca Postigo⁵

¹Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Madrid. ²Hospital Clínic Barcelona, Barcelona, ³Hospital General Universitario de Valencia, Valencia, ⁴Hospital Universitario de Cruces, Barakaldo, Bizkaia, ⁵Departamento Médico Vacunas GSK, Madrid, España.

Introducción

Las exacerbaciones en EPOC, causadas en parte infecciones, tienen un impacto negativo en la calidad de vida de los pacientes. La vacunación frente a diferentes patógenos es una medida preventiva eficaz y recomendada en el manejo de pacientes con EPOC¹

Objetivos

El objetivo principal de este estudio fue conocer las actitudes y percepciones de los neumólogos respecto a la vacunación de sus pacientes con EPOC.

Material y Métodos

Estudio descriptivo, transversal, multicéntrico, no aleatorizado. Participaron neumólogos con más de cinco años de experiencia y que atendían 10 - 50 pacientes con EPOC semanales. Los datos se recogieron mediante un cuestionario electrónico.

Resultados

Un total de 100 neumólogos, principalmente de Madrid y País Vasco participaron en el estudio. El 55% eran mujeres, la edad media fue de 41,3 años. El 67% tenían más de 11 años de experiencia en el ejercicio de la Neumología. En cuanto a la presión asistencial, el 60% asistía a más de 25 pacientes a la semana (figura 1). Más del 96% ejercía en consultas hospitalarias (figura 2), principalmente (83%) en centros de nivel III (figura 3).





Figura 2. Tipo de consulta. Multirresponsta. N = 100




Figura 3. Hospital según cartera de servicios. N = 96

Todos los participantes declararon conocer las vacunas recomendadas según las Guías Clínicas y Sociedades Científicas para el paciente con EPOC (figura 4) y el 38% revisaba el estado vacunal de sus pacientes al menos una vez al año (figura 5). El 99% recomendaba la vacunación (figura 6), indicando las vacunas antineumocócica y antigripal y el 99% la vacunación frente a COVID-19 (figura 7).

Figura 1. Cualificación de la muestra.



Figura 4. Conocimiento de las vacunas recomendadas según las guías clínicas y sociedades científicas para el paciente con EPOC. N = 100




Figura 5. Frecuencia con la que revisa el estado vacunal de sus pacientes con EPOC. N = 100




Figura 6. Suele recomendar la vacunación a sus pacientes con EPOC. N = 100




Figura 7. Vacunas de recomienda. Multirresponsta. N = 99

Se identificaron los principales motivos de los pacientes para la aceptación vacunal, la preocupación por los efectos adversos con un 71% fue la principal barrera, seguida de la falta de confianza en las vacunas (60%) y baja la efectividad en casos previos (48%) (figura 8). El 96% de los participantes consideraba necesario un calendario específico de inmunización para pacientes con enfermedades respiratorias (figura 9) y el 78% percibió insuficiente la promoción institucional de la vacunación (figura 10). El 74% de los participantes afirmó que después de participar en el estudio VAC-EPOC incrementaría sus recomendaciones (figura 11).




Figura 8. Motivos habituales de rechazo de la vacunación por parte de los pacientes. Multirresponsta. N = 100




Figura 9. Necesario un calendario de inmunización para los pacientes con enfermedades respiratorias? N = 100




Figura 10. ¿Sociedades científicas, centros sanitarios, organismos gubernamentales, etc., promueven lo suficiente la vacunación en la EPOC? N = 100




Figura 11. Completar esta encuesta, aumentará la indicación de vacunación de sus pacientes con EPOC. N = 100

Discusión

- ❖ Los resultados muestran una elevada concienciación de los neumólogos sobre la vacunación en pacientes EPOC.
- ❖ Se identifican barreras para la aceptación de la vacunación por parte de los pacientes que muestran la necesidad de reforzar la educación sanitaria.
- ❖ Existe una alta recomendación vacunal entre los neumólogos.
- ❖ El acceso a las vacunas o a su financiación podría ser una barrera.
- ❖ Según la escasa evidencia disponible, los pacientes respiratorios no presentan coberturas vacunales elevadas en las vacunas incluidas en las guías², por lo que recomendación no siempre se traduce en vacunación.

Conclusiones

La recomendación por parte del neumólogo, un calendario específico y estrategias de promoción institucional podrían contribuir a mejorar la aceptación y vacunación en los pacientes con EPOC.

1- Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD). Global Strategy for the Diagnosis, Management, and Prevention of Chronic Obstructive Pulmonary Disease. 2026 Report.
2-Alonso, M.; et al. Time Trends (2012–2020), Sex Differences and Predictors for Influenza Vaccination Uptake among Individuals with Chronic Obstructive Pulmonary Disease in Spain. J. Clin. Med. 2022, 11, 1423.

Conflicto de Interés: Estudio financiado por GSK. ESP es empleada de GSK. No se declaran otros conflictos de intereses relacionados con este trabajo.

Agradecimientos: Los autores agradecen a SANED from Medscape y a Costello Medical (Reino Unido) la coordinación de la publicación en nombre de GSK.