



14 al 17 octubre
2026

VIGO

Situando a las vacunas en su lugar,
una prioridad sanitaria y social

Proyecto de investigación: Cobertura vacunal antineumocócica desagregada por tipo de vacuna en la población adulta de la Comunidad de Madrid

Diego Martín -Caro Álvarez ^(a), Javier García Iglesias ^(a), Alba Morós Cegarra^(b), María Herranz García^(b), Verónica García Pérez ^(b) Antonio Nicolás Lavado Bahon ^(c)

^a Enfermero Centro de salud Somosaguas. Dirección Asistencial Noroeste. Gerencia de Atención Primaria, SERMAS, Madrid, España.

^b Enfermera Centro de salud Pozuelo Estación. Dirección Asistencial Noroeste. Gerencia de Atención Primaria, SERMAS, Madrid, España.

^c Enfermera Centro de salud San Juan de la Cruz. Dirección Asistencial Noroeste. Gerencia de Atención Primaria, SERMAS, Madrid, España.

INTRODUCCIÓN



- La enfermedad neumocócica invasiva (ENI) es una causa relevante de morbilidad y mortalidad en la población adulta, especialmente en las personas de edad avanzada y con comorbilidades.
- La vacunación antineumocócica es una estrategia clave de prevención, con diferentes tipos de vacunas disponibles (VNC20, VNC13 y VNP23).
- En la Comunidad de Madrid, los serotipos 8 y 3 son los más frecuentes. Resulta relevante el serotipo 8, ya que presenta una elevada incidencia y está incluido en la vacuna conjugada 20-valente (VNC20), pero no en la vacuna conjugada 13-valente (VNC13).
- Conocer la cobertura vacunal en la población adulta y su distribución por tipo de vacuna permite identificar áreas de mejora y orientar estrategias de Salud Pública.

OBJETIVOS



Describir la cobertura vacunal desagregada frente al neumococo en la población adulta, pertenecientes a distintos centros de salud de la Dirección asistencial Noroeste de la Comunidad de Madrid, según el calendario de vacunación del adulto.

MATERIAL Y MÉTODOS



Estudio observacional retrospectivo y multicéntrico. Desde 2005 hasta Diciembre 2025.



Población: personas adultas (≥ 60 años) adscritas a distintos centros de salud de la Dirección Asistencial Noroeste (SERMAS, Comunidad de Madrid).



Fuente de datos: Historia clínica electrónica (AP-Madrid).




Variables: demográficas, tipo de vacuna antineumocócica registrada (VNC 20, VNC13, VMP23).

POBLACIÓN DE ESTUDIO



57.455

Personas adultas



31.450(54,7%)
mujeres



26.005(45,3%)
hombres


RESULTADOS (PROVISIONALES)

Resultados preliminares, pendientes de análisis completos.

Cobertura vacunal antineumocócica distribución por sexo

TOTAL	SEXO		NINGUNA VACUNA	CONJUGADA 20	CONJUGADA 13	POLISACARIDA 23
57.455	MUJER	31.450	9.642 (30,7)	4.563 (14,5)	11.429 (36,3)	5.816 (18,5)
	HOMBRES	26.005	5.584 (21,5)	4.403 (16,9)	10.545 (40,5)	5.473 (21,1)

Distribución por tipo de vacuna en la población total



Vacunación correcta y vacunación incompleta en la población total

VACUNACIÓN CORRECTA		VACUNACIÓN INCOMPLETA	
30.940 (53,9%)		26.515 (46,1%)	
Conjugada 20 8.966 (15,6%)	Conjugada 13 21.974 (38,2%)	Polisacárida 23 11.289 (19,7%)	No vacunado 15.226 (26,5%)

Vacunación correcta VS vacunación incompleta

