



14 al 17 octubre
2026

VIGO

Situando a las vacunas en su lugar,
una prioridad sanitaria y social

C-0364: LA VACUNACIÓN FRENTE A HERPES ZÓSTER EN COHORTES DE 65 Y 80 AÑOS. REDUCCIÓN DE LA INCIDENCIA EN VACUNADOS

Martínez Portillo A¹, Soriano López J², Zornoza Moreno M², Ros Abellán MP², Chirlaque López MD¹, Pérez Martín JJ²

1 Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones de la Región de Murcia. 2 Servicio de Prevención y Protección de la Salud. Dirección General de Salud Pública y Adicciones de la Región de Murcia

CONTENIDO

Objetivos:

Evaluar la diferencia de la incidencia acumulada de herpes zóster entre las personas vacunadas y las no vacunadas pertenecientes a las cohortes que cumplieron 65 y 80 años, en la Región de Murcia, a lo largo del periodo 2023-2025.

Métodos:

Se calculó la incidencia acumulada de personas diagnosticadas de herpes zóster en Atención Primaria (código CIAP S70) por cada 100.000 habitantes para los años 2023, 2024 y 2025 en la Región de Murcia. Las cohortes con indicación de vacunación por edad desde el inicio de la misma hasta el año 2025 eran aquellas personas nacidas entre 1958 y 1960 (cumplían 65 años), así como las nacidas en 1944 y 1945 (cumplían 80 años). La identificación del estado de vacunación se realizó a través de cruce con el sistema de información del Registro Regional de Vacunaciones (VACUSAN).


Se clasificó a las personas como vacunadas cuando habían recibido la pauta completa (2 dosis) de vacuna adyuvada de subunidades, y como no vacunadas si no habían recibido ninguna vacuna.

Resultados:

En 2025 la incidencia de HZ en personas vacunadas fue un 77,6 % inferior a la de las no vacunadas (con una incidencia acumulada de 231 frente a 1.034 casos por 100.000 habitantes, respectivamente).

Figura 1. Incidencia acumulada de herpes zóster (CIAP S70) por año evaluado y grupos etarios.

Al desagregar por cohortes (figura 1), la reducción de incidencia en la cohorte de las personas vacunadas a los 80 años (nacidas en 1944 y 1945) fue superior a la de las cohortes vacunadas a los 65 años (nacidas entre 1958 y 1960). La reducción en el año 2025 fue de un 91,3 % en los de mayor edad frente a un 70,8 % de reducción en los de 65 años. Este patrón fue observado también en las cohortes que estaban vacunadas en 2024.



Discusión y conclusiones:

El herpes zóster supone una alta carga de enfermedad en las personas de 65 años o más. Sin embargo, a pesar de coberturas aún mejorables, se dispone de una vacuna incluida en el Calendario de Vacunaciones e Inmunizaciones a lo largo de toda la vida que se asocia a reducciones consistentes de la incidencia acumulada en los dos primeros años de vacunación. Destaca la mayor reducción de incidencia en las cohortes de 80 años, si bien podría explicarse por el menor valor predictivo positivo del diagnóstico clínico en las personas de 65 años. Son fundamentales estrategias de mejora de coberturas en la población candidata a la vacunación frente a herpes zóster en base a los datos de reducción de incidencia acumulada obtenidos.