



C0372 EFECTIVIDAD DE LA VACUNACIÓN FRENTE AL HERPES ZÓSTER EN PERSONAS DE 79 A 81 AÑOS

JESÚS SORIANO LÓPEZ¹, ALEJANDRO MARTINEZ PORTILLO¹, MATILDE ZORNOZA MORENO¹, MARÍA DEL PILAR ROS ABELLÁN¹, MARÍA DOLORES CHIRLAQUE LÓPEZ¹ JAIME JESÚS PÉREZ MARTÍN¹.

1.CONSEJERÍA DE SALUD DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA (MURCIA), ESPAÑA

CONTENIDO

Objetivos: evaluar la efectividad vacunal (EV) frente al herpes zóster en personas de 79 a 81 años en la Región de Murcia entre 2023 y 2025.


Método: para el cálculo de la EV se obtuvieron los episodios de herpes zóster (código CIAP S70) registrados en Atención Primaria entre 2023 y 2025 dentro del sistema público de salud. El estado de vacunación se obtuvo del registro regional, considerando como fecha de vacunación efectiva los 14 días posteriores a la administración de la dosis. Se calculó la EV mediante $(1-HR)*100$ a partir de un modelo de regresión de Cox ajustado por edad y sexo, tratando las variables estado de vacunación y edad como dependientes del tiempo.

Resultados: en las personas nacidas entre 1944-1945, durante el periodo 2023-2025 la densidad de incidencia fue:

- 1102,3 casos por 100.000 personas-año en no vacunados (554 episodios).
- 197,9 casos por 100.000 personas-año en vacunados con 1 dosis (4 episodios)
- 177,2 casos por 100.000 personas-año en vacunados con 2 dosis (9 episodios).

La efectividad vacunal ajustada

- 1 dosis 79,75% (IC95%: 43,4-92,8)
- 2 dosis 82,37% (IC95%: 63,3-91,5).



Discusión: el herpes zóster supone una elevada carga de enfermedad. A pesar de coberturas todavía mejorables, se dispone de una vacuna incluida en el calendario de vacunación a lo largo de toda la vida que ha demostrado su efectividad en vida real. Como limitaciones destacan el corto periodo de seguimiento, los problemas inherentes a los registros sanitarios, que pueden condicionar la inespecificidad de la variable resultado e infraestimar la efectividad, la falta de ajuste por comorbilidades y los antecedentes de herpes zóster previo/recurrencias.

Conclusiones / Recomendaciones: son fundamentales estrategias de mejora de coberturas en la población candidata a la vacunación frente a herpes zóster.