



**14 al 17 octubre
2026**

VIGO

Situando a las vacunas en su lugar,
una prioridad sanitaria y social

C-0373: INCIDENCIA DE ENFERMEDAD NEUMOCÓCICA INVASIVA EN GRUPOS VACUNADOS VS NO VACUNADOS DE LA POBLACIÓN ADULTA EN UNA COMUNIDAD AUTÓNOMA

Martínez Portillo A¹, Zornoza Moreno M², Ros Abellán MP², Soriano López J², Chirlaque López MD¹, Pérez Martín JJ²
1 Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones de la Región de Murcia. 2 Servicio de Prevención y Protección de la Salud. Dirección General de Salud Pública y Adicciones de la Región de Murcia

CONTENIDO

Objetivos:


Evaluar la incidencia acumulada (IAc) anual de enfermedad neumocócica invasiva (ENI) en la población de 15 años o más de la Región de Murcia entre 2023 y 2025 según estado de vacunación.

Métodos:


Se recogieron los episodios de ENI registrados por el sistema de vigilancia de enfermedades transmisibles de la Región de Murcia (SIVIET-RM). Se calculó la IAc por 100.000 habitantes en los grupos de 15-64 y ≥ 65 años en el total de la población de cada grupo y según su estado vacunal (obtenido del sistema de información del Registro Regional de Vacunaciones, VACUSAN), clasificándoles en población vacunada (PV) o población no vacunada (PNV). Se definió como correctamente vacunada aquella persona con una dosis de vacuna conjugada de 20 serotipos (VNC20) o, en caso de haber recibido una vacuna polisacárida de 23 serotipos (VNP23), que la hubiera recibido en los últimos 5 años.

Resultados:

Entre las personas de 65 o más años, la IAc en la PNV fue 13,2 veces superior a la de PV en 2025. Esta razón de IAc fue de 7,7 y de 6,7 veces en 2024 y 2023, respectivamente



En cambio, en las personas de 15 a 64 años, en la que la proporción de población vacunada es menor, la incidencia en ambos grupos vacunales creció en todo el periodo. En la PNV, la incidencia fue un 41,8 % superior en 2025. En 2024 la IAc fue 2,04 veces superior y en 2023 2,09 veces.



La evolución de la IAc de ENI y coberturas vacunales antineumocócicas se muestra en la tabla adjunta:

Discusión y conclusiones:

La razón de incidencias en ≥ 65 años muestra consistentemente un riesgo mayor en la PNV. Estas diferencias siguen siendo patentes en 15-64 años, pese a que la PV en esta edad corresponde a grupos de riesgo por comorbilidades. La IAc global en 65 años o más ha ido en descenso en el último año estudiado, en paralelo al aumento de la vacunación con vacuna conjugada, mientras en el de 15-64 años la IAc global sigue en ascenso.

Grupo etario		2023	2024	2025
15-64 años	IAc	4,48	5,25	7,68
	Cobertura vacunal	3,35 %	3,01 %	7,56 %
65 años o más	IAc	26,81	28,68	20,71
	Cobertura vacunal	21,12 %	22,42 %	36,78 %