



**14 al 17 octubre
2026**

VIGO

Situando a las vacunas en su lugar,
una prioridad sanitaria y social

De la búsqueda activa al objetivo ministerial: cómo una estrategia enfermera transformó la vacunación antineumocócica en personas con diabetes

Lostal Gracia MI, Latorre izquierdo A, Guerrero Gallego T, Pablos Mur C, Sampietro Arcas N, Saz Soler I

Centro de Salud Amparo Poch Sector Zaragoza 1. Servicio Aragonés de Salud. Zaragoza

Introducción y justificación

Las personas con diabetes tienen mayor riesgo de enfermedad neumocócica y de sus complicaciones; la vacunación puede reducir ingresos y costes.

En nuestro Equipo de Atención Primaria urbano, la cobertura antineumocócica en pacientes diabéticos estaba por debajo del **objetivo ministerial del 75%**:

31,1%

Cobertura inicial
< 65 años

62,2%

Cobertura inicial
≥ 65 años

75%

Objetivo
ministerial

Objetivo

Aumentar la cobertura vacunal frente a neumococo en personas con diabetes mediante una estrategia enfermera de identificación sistemática y captación activa de pacientes con pauta incompleta o sin vacunar.

Metodología

Proyecto de mejora en Atención Primaria (junio–diciembre 2025).
Intervención multifactorial con cuatro fases:

1

Identificación

Pacientes con diabetes (CIAP-2 T90) y su situación vacunal (NE23-1, NE13-1, NE20-1) en la historia clínica electrónica.

2

Captación activa

Listados nominales, llamada telefónica y captación oportunista en consulta.

3

Vacunación y registro

Administración de VNC20, actualización de registros, educación sanitaria a pacientes y sesiones a profesionales.


4

Evaluación

Indicador de impacto: % con pauta antineumocócica completa en < 65 y ≥ 65 años (datos HCE, Sector Zaragoza 1).


Resultados

Cobertura con pauta completa: inicial vs final




Final: 230/526 (< 65 años) y 543/722 (≥ 65 años). **En ≥ 65 años se alcanzó el objetivo ministerial del 75%.**

Captación activa y administración de VNC20



Sobre pacientes no vacunados o con pauta incompleta: contactados 300/385 y 252/324; VNC20 administrada 91/385 y 155/324.

Comparación con el Sector Zaragoza 1



Cobertura final con pauta completa. El Sector agrupa 13 centros de salud urbanos y rurales.

Conclusiones

- Una estrategia enfermera de búsqueda activa y seguimiento estructurado mejora la cobertura de vacunación antineumocócica en personas con diabetes.
- La intervención permitió alcanzar el objetivo ministerial (75%) en la población diabética ≥ 65 años.
- Los menores de 65 años siguen precisando intervenciones más intensivas de captación y educación sanitaria.
- Estrategia reproducible y coste-efectiva, basada en recursos propios de Atención Primaria, que contribuye a reducir desigualdades vacunales en grupos de riesgo.