



14 al 17 octubre
2026

VIGO

Situando a las vacunas en su lugar,
una prioridad sanitaria y social

CÓDIGO: C-0397

Sarampión modificado en personal sanitario inmunizado: un desafío diagnóstico



Autores: MC Salas Butrón, JA Sánchez Leona, JM Andino Agurcia, M Sánchez Gómez, M Pablos López, R Perea Rafael.
Servicio de Medicina Preventiva, Complejo Hospitalario Universitario de Toledo, SESCAM.

COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE TOLEDO
Servicio de Medicina Preventiva



OBJETIVOS / CONTEXTO

El sarampión sigue siendo un importante problema de salud pública y su eliminación es prioridad de la OMS. España ha perdido recientemente su estatus de eliminación por transmisión continuada, con repunte de casos desde 2024, brotes autonómicos, brechas en la cobertura vacunal y aumento de casos importados. En el ámbito sanitario se describe el sarampión modificado en personal vacunado: forma atenuada que dificulta la sospecha diagnóstica y facilita la transmisión.




MÉTODO

Caso índice: varón de 34 años, sin antecedentes de vacunación. Fiebre de 39 °C, exantema facial, odinofagia y tos.
Aislamiento respiratorio ante la sospecha; confirmación por serología (IgM positiva).
Rastreo de contactos: 3 casos secundarios — el primero, un profesional sanitario que atendió al paciente; a partir de este, 2 casos adicionales sin exposición directa al caso índice.



RESULTADOS

Perfil de casos: sexo, edad media y estado vacunal



Cadena de transmisión



Presentación clínica según estado vacunal

	Caso índice (no vacunado)	Caso secundario sin vacunación documentada	Casos secundarios con pauta completa (n = 2)
Fiebre	Presente	Presente	Ausente
Exantema	Presente	Presente	Atenuado
Tos	Presente	Presente	No descrito
Conjuntivitis	No descrito	Presente	No descrito
Odinofagia	Presente	No descrito	No descrito

Los 2 casos con pauta completa: forma leve, sin fiebre y con exantema menos extenso.

El caso sin vacunación documentada: exantema, fiebre, tos y conjuntivitis.



DISCUSIÓN

En el actual contexto de resurgimiento del sarampión en España, el ámbito sanitario no está exento de riesgo de transmisión, incluso entre personal sanitario vacunado. El sarampión modificado cursa con síntomas leves y atípicos, dificultando su sospecha diagnóstica.



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Mantener alta sospecha de sarampión ante exantemas leves o atípicos en personal sanitario, incluso vacunado.
- Verificar el estado inmunitario frente a sarampión de todo el personal sanitario.
- La coordinación entre Medicina Preventiva, Salud Laboral y Epidemiología fue clave para limitar la transmisión.