



EFECTOS ADVERSOS NEUROLÓGICOS DE LA VACUNA FRENTE A FIEBRE AMARILLA. DESCRIPCIÓN Y BÚSQUEDA DE CASOS.

González A., Suárez JM., Regueira A., Lorenzo MJ., Estévez AB, Barreiro A.
Servicio Medicina Preventiva. Complejo Hospitalario Universitario de Vigo.

INTRODUCCIÓN

La inmunización frente a Fiebre Amarilla (fa) es altamente eficaz y generalmente segura. La mayoría de las reacciones son leves o moderadas (Fiebre transitoria, dolor local)

Existen EVENTOS ADVERSOS GRAVES (Raros):
Enfermedad neurotrópica y viscerotrópica. -
Estimación aparición: **3-4** casos/ 1000000 dosis administrada

Entre 2024 y 2025 se detectaron en MPR del Área Sanitaria Vigo: **2 eventos adversos** (Meningitis linfocitaria) tras la vacunación frente FA. La frecuencia es muy superior a la publicada en la literatura.

METODOLOGÍA

- DESCRIPCIÓN EVENTOS ADVERSOS GRAVES DETECTADOS: **MENINGITIS LINFOCITARIA**
- **ESTUDIO OBSERVACIONAL RETROSPECTIVO** de Eventos Adversos NO identificados previamente tras vacunación FA

Período de estudio: 2022 - 2025

1095

Pacientes vacunados frente FA

Evento adverso identificado en contacto sanitario en 3 meses post-vacunación

RESULTADOS

CASO 1

VARÓN 37 años

Enfermedades médicas: B-Talasemia menor

Fecha vacunación: **20,9,2024**

LOTE W3H981V

Fecha inicio de los 1º síntomas: 24,9,2026

URGENCIAS: 9,10,2024:

MENINGITIS LINFOCITARIA

Fiebre – Cefalea – Sudoración Nocturna – MEG – Cefalea holocraneal

HOSPITALIZADO: 14,10,24 – 24,10,24

Vigilancia sintomatología clínica

LCR: 15,10,2024

Leucocitos: 175

Mononucleados 95%

LCR: Técnica molecular: 15,10,2024

Virus FA: Negativo

CASO 2

MUJER 40 años

NO enfermedades médicas de interés.

Fecha vacunación: **23,10,2025**

LOTE X3B962V

Fecha inicio de los 1º síntomas: 5,11,2025

URGENCIAS: 6,11,2025

MENINGITIS LINFOCITARIA

Fiebre – Cefalea – MEG

HOSPITALIZADO: 7,11,25 – 10,11,2025

Vigilancia sintomatología clínica

LCR: 6,11,2025

Leucocitos: 219

Mononucleados 98%

LCR: Técnica molecular: 6,11,2025

Virus FA: POSITIVO

ESTUDIO OBSERVACIONAL EA POST-VACUNA FA

1095

Pacientes vacunados frente FA (2022-2025)

Mujeres: 51%

Edad: Media 33 años. 68% entre 15-45 años

POSIBLES EVENTOS ADVERSOS: **6,1%**

+
Cuadros febriles
Vómitos/Diarrea
Cuadros de malestar general / Miastenia
2 Dolor Precordial/Taquicardia
1 Leucopenia/trombopenia transitoria
1 Exantema
-

NINGÚN CASO SOSPECHOSO DE CUADRO NEUROLÓGICO

CASOS DE EA VACUNA FA

CONCLUSIONES/INTERÉS

Los **EA** asociados a la vacunación, aún siendo raros, **se producen**

Los **EA** asociados a la vacunación **NO** siempre son bien identificados por los pacientes,

Las **vacunas** son **SEGURAS**, y los EA asociados, en su mayoría, son leves y transitorios

Es importante tener en cuenta las limitaciones en el uso de ciertas vacunas, entre ellas la vacuna de la FA (Edad, Patologías previas...)

RECOMENDACIONES

TODA UNIDAD DE VACUNACIÓN DEBERÍA FACILITAR INFORMACIÓN DETALLADA DE POSIBLES SIGNOS/SÍNTOMAS TRAS LA VACUNACIÓN

Especialmente en aquellos cuadros potencialmente graves y en vacunas con reactogenicidad conocida

